

ДИСКУССИИ

616.89-053.2-07

2

«

»

(3).

(2)

()

»

Ранние дисфункциональные состояния в анамнезе больных шизофренией в сопоставлении с результатами обследования выборочных групп детского населения

Виды и формы проявления ранних дисфункциональных состояний	Больные шизофренией	Детское население
Психопатологические:		
невротические реакции и состояния	61,3%	22,6–30,8%
детские страхи	21,5%	19,6–24,1 %
ситуационные невротические реакции	12,9%	3,6–5,7 %
невропатические черты характера	6,5%	5,8–7,5%
кратковременные нарушения мышления и восприятия	2,1%	3,8–7,3 %
эпизоды типа сверхценных переживаний	18,3%	0%
эпизоды измененного восприятия	8,6%	0–0,2 %
прекращающие изменения характера или эпизоды необычных увлечений	9,7%	0 %
эпизоды изменения аффективности и психической продуктивности	12,9%	0 %
	8,6%	0–0,2%
Неврологические:		
заикание и другие нарушения речи	33,3%	16,7–37,0%
снохождение, сноговорение	14,0%	1,5–3,4%
цефалгический синдром	7,5%	2,4–6,5%
тики, гиперкинезы функционального характера	4,3%	7,4–13,5%
ночной энурез	5,4%	1,8–5,3%
	2,1%	2,6–7,3 %
Соматовегетативные	5,4%	12,3–26,7%

28,3% 45,9%.

15% 19.2%,

12,3%	:	26,7%.
—		— 3,7% 11,7%;
—		— 6,8%
15,5%;		
—		—, —
—		— 6,8% 15,5%.